



EXCELENCIA PARA LA SALUD

FLOXLEVO LEVOFLOXACINA 500 MG

FLOXLEVO es un antibiótico fluorquinolónico con actividad bactericida de amplio espectro resistente a la acción de las betalactamasas y su actividad bactericida se debe a la inhibición de la topoisomerasa tipo II bacteriana (DNA girasa), lo que confiere a esta molécula un espectro amplio no sólo para gérmenes grampositivos y negativos, sino que también para bacterias atípicas intracelulares y de actividad moderada para bacterias anaerobias, que combinado con AMOXITENK-PLUS por vía oral o el MEROTENK IM aumenta su potencia bactericida anaeróbica. La forma oral del FLOXLEVO es un 100% disponible y su biodisponibilidad no es afectada por los alimentos, aunque sí por cationes trivalentes, antiácidos y hierro.

Por tal motivo es aconsejable administrarlo 2 horas después de dichos compuestos. El FLOXLEVO tiene una farmacocinética lineal entre 50 y 1000 mg y su distribución en los fluidos y tejidos alcanza niveles superiores a los del plasma, particularmente: 1) en el árbol broncopulmonar superior e inferior (exacerbación de bronquitis agudas y crónicas); 2) en el aparato genitourinario; 3) en el tejido dérmico; 4) en el tejido prostático; 5) en ginecología; 6) en odontología; 7) en osteomielitis; y 8) por su elevada biodisponibilidad 100% oral permite cambiar la administración parenteral por la vía oral sin ajuste de dosis, es decir, su absorción es completa.

INDICACIÓN	RÉGIMEN DE DOSIS DIARIAS DE ACUERDO A LA SEVERIDAD	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Neumonía adquirida de la comunidad	500 mg dos veces por día	7 a 14 días
Sinusitis aguda	500 mg una vez por día	12 a 14 días
Exacerbación aguda de bronquitis crónica	500 mg una vez por día	7 a 14 días
Infecciones complicadas del árbol urinario - pielonefritis	500 mg una vez por día	7 a 12 días
Infecciones de la piel y tejidos blandos	500 mg una vez por día	7 a 14 días
Infecciones abdominales		
Colecistitis	500 mg dos veces por día	7 a 14 días
Diverticulosis	500 mg una vez por día	7 a 10 días
Infecciones óseas	500 mg dos veces por día	15 días
Osteomielitis	continuar con 500 mg	Una vez por día de 1 a 2 meses
Periodontitis con compromiso maxilar	500 mg por día	7 a 14 días
Cistitis aguda no complicada	1000 mg (dos compr. Una toma)	1 día (24 horas)

En pacientes ancianos: no se requiere ajustar la dosis; en pacientes con disminución de la filtración glomerular menor a 10 ml/ min se debe iniciar con 1/2 comprimido, 250 mg.
En pacientes con función hepática alterada no se requiere ajustar la dosis, pues Floxlevo no se metaboliza en el hígado.