



**Biotenk**

EXCELENCIA PARA LA SALUD

## **MAXTENK (pramipexol)** **Agonista dopaminérgico no ergotínico**

Tratamiento de comienzo para la enfermedad de Parkinson  
y el insomnio provocado por el síndrome de piernas inquietas

MAXTENK: es un agonista dopaminérgico D2/D3 no ergotínico que resulta efectivo como monoterapia en comienzo de la enfermedad de Parkinson (akinesia, rigidez y temblor) o combinado a la levodopa en casos más severos.

Al ser un derivado no ergotínico no provoca las complicaciones de eritromelalgia, vasospasmo distal, fibrosis pleuropulmonar, fibrosis retroperitoneal, derrame pleural y valvulopatía cardíaca restrictiva. Controla el síndrome de piernas inquietas SPI (dolor, inquietud, disconfort e insomnio, *restless legs syndrome*) y mejora la calidad del sueño en pacientes con enfermedad de Parkinson o sin ella.

Mejora el REM y las alteraciones del sueño. Reduce las fluctuaciones motoras de la diskinesia manteniendo un control sostenido y continuo de la enfermedad de Parkinson.

MAXTENK constituye un notable adyuvante en el tratamiento de los estados depresivos tanto en pacientes con enfermedad de Parkinson, como en los síndromes depresivos unipolares o bipolares.

La administración crónica impide la agresión y muerte neuronal de los núcleos de la base por exceso de dopamina o por sustancias tóxicas, efecto que reduce el riesgo de progresión de la enfermedad de Parkinson.

La administración de MAXTENK debe ser progresiva: medio comprimido de 0,25 mg 2 o 3 veces por día e ir aumentando semanalmente hasta que los síntomas desaparezcan. No se recomienda administrar más de 4,5 mg diarios.

La sustitución de MAXTENK por derivados ergotínicos puede ser inmediata o progresiva, sin efectos secundarios.

La equivalencia con bromocriptina es de 1/10, es decir 0,25 mg de MAXTENK equivalen a 2,5 mg de bromocriptina o con pergolide 1/1, es decir, igual dosificación.