



Biotenk

EXCELENCIA PARA LA SALUD

¿Cuando existe dificultad en la micción se puede mejorar la urodinamia y reducir el tamaño prostático?

Los trastornos urodinámicos que aparecen en la hipertrofia prostática benigna, así como también en el adenoma prostático, presentan síntomas clínicos definidos, tales como: 1.- retención urinaria, 2.- incontinencia urinaria, 3.- insuficiencia renal, y 4.- infecciones recurrentes del tracto urinario. Dichos signos y síntomas tienen importancia para evaluar la progresión de estas afecciones benignas de la próstata, las cuales si no se resuelven con un adecuado tratamiento médico, suelen tener un tratamiento quirúrgico.

Se ha observado que el tratamiento combinado con un inhibidor de la 5-alfa reductasa como el PROSMIN y un bloqueante selectivo alfa-1 adrenérgico como el VAZOSIN, potencian su acción y no sólo reducen el tamaño de la próstata o el adenoma prostático sino que provocan una notable mejoría en la urodinamia vesico-uretral.

La administración de PROSMIN 5 mg conjuntamente con VAZOSIN 2 a 4 mg diarios provocan una notable mejoría en los síntomas y una reducción del tamaño prostático, con o sin adenoma.

Un prerrequisito para el éxito del tratamiento es que éste se mantenga por largo tiempo, es decir, que el tratamiento resulte prolongado (más de un año).

El VAZOSIN contiene un fármaco que independientemente de su actividad bloqueante alfa-1 selectiva, aumenta la expresión del ARN mensajero de una enzima la óxido nítrico sintasa, que posee una acción vasodilatadora a nivel de los órganos genitales y reduce el efecto sobre los problemas de erección

Por otra parte, el VAZOSIN provoca un aumento del ATP-ligado a un transportador, que determina el aumento del colesterol-HDL.

En síntesis, el VAZOSIN mejora la función endotelial, disminuye la presión diastólica, la dislipidemia y la resistencia a la insulina en pacientes con hipertensión arterial, y en dosis de 4 mg posee una gran eficacia en el transporte y expulsión de los cálculos en el uréter distal renal (5 -10 mm). Si concomitantemente existe prostatitis, ésta debe ser tratada.