



Biotenk

Zoltenk

Reduce, desde su origen, la producción de ácido gástrico
y aumenta la tolerancia de los antiinflamatorios

La eficacia y la prevención de las lesiones del tracto digestivo superior en pacientes que reciben antiinflamatorios en forma crónica se efectuaron a través de una revisión de la literatura sobre pacientes que recibían tratamiento antiinflamatorio y diferentes agentes protectores gástricos. Sobre más de 40 estudios controlados por endoscopia gastroduodenal revelaron que en pacientes que recibían tratamiento crónico por afecciones articulares, los bloqueantes de la bomba protónica como el **Zoltenk** (omeprazol) resultó efectivo.

El **Zoltenk** posee una mayor tolerancia en los tratamientos crónicos y produjo una incidencia marcadamente menor de lesión a nivel de la mucosa gastroduodenal.

¿Cuándo se sufre de acidez?

La sensación más frecuente es la de ardor, quemazón y dolor gástrico. En ocasiones hay reflujo que si este llega a la faringe, provoca irritación y una faringitis química. Las causas más comunes, son ciertos medicamentos con acción antiinflamatoria, el alcohol, el café, intolerancia a ciertos alimentos, el estrés o la infección por *Helicobacter Pylori*, bacteria causal de ulcus gastroduodenal y otras patologías más severas.

¿Qué provoca cuando esta es recurrente?

Cambios de humor, insomnio y cuando hay inflamación duodenal, malestar gástrico con trastornos digestivos.

¿El reflujo es común?

Alrededor de un 50% de las personas de más de 50 años lo padecen. El reflujo de ácido gástrico a una mucosa, la esofágica, que no esta preparada para recibirlo, produce inflamación y provoca dolor.

¿Es importante suprimir la sensación de acidez?

Sin lugar a dudas que sí, por dos razones, una porque provoca gastritis o duodenitis y si hay reflujo, esofagitis y la segunda porque el *Helicobacter Pylori* necesita de hidrógeno para crecer. Esta es una buena razón para suprimir la secreción ácida o de hidrógeno. **Zoltenk** produce 24 horas de protección con una sola toma diaria, previniendo el malestar gástrico y los cambios de humor. Además impide el crecimiento del *Helicobacter Pylori*.

¿Zoltenk modifica la digestión?

Al contrario la normaliza, al mejorar la irritación de la mucosa digestiva.

¿Cómo se debe administrar el Zoltenk?

Para obtener una acción inmediata se debe administrar con el estómago vacío o en ayunas.

Zoltenk: omeprazol 20 mg, estuches de 7, 14 y 28 cápsulas.